



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期							
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化			①	②	③						④ (注1)											
肺炎球菌 (PCV13)	不活化			①	②	③						④											(注2)
B型肝炎	ユニバーサル			①	②																		(注3)
	母子感染予防		①	②							③												
ロタウイルス	1価			①	②					(注4)													
	5価			①	②	③				(注5)													
4種混合 (DPT-IPV)	不活化				①	②						③											(注6)
3種混合 (DPT)	不活化				①	②						③											(注6)
2種混合 (DT)	不活化																						⑤ (注7)
ポリオ (IPV)	不活化				①	②						③											(注6)
BCG	生											①											(注8)
麻疹・風疹混合 (MR)	生																						② (注10)
水痘	生																						①
おたふくかぜ	生																						② (注12)
日本脳炎	不活化																						① ② ③ (7.5歳まで)
インフルエンザ	不活化																						④9-12歳
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化																						毎年 (10、11月などに) ①②
																							(注13)
																							小6 中1 ①②③ (注14) 中2～高1

定期接種の推奨期間
定期接種の接種可能な期間
任意接種の推奨期間
任意接種の接種可能な期間
添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
健康保険での接種時期