



ワクチン	種類	乳児期										幼児期					学童期／思春期							
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
B型肝炎	ユニバーサル			①	②						③		(注1)											
	母子感染予防	①	②							③														
ロタウイルス	1価			①	②		(注2)																	
	5価			①	②	③		(注3)																
肺炎球菌 (PCV13、PCV15)	不活化			①	②	③					④											(注4)		
5種混合 (DPT-IPV-Hib)	不活化			①	②	③					④						7.5歳まで							
3種混合 (DPT)	不活化																① (注5)				② 11-12歳 (注6)			
2種混合 (DT)	不活化																				① 11歳	12歳		
ポリオ (IPV)	不活化																① (注7)							
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合	不活化			①	②	③					④											(注8)		
4種混合 (DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合	不活化			①	②	③					④						7.5歳まで							
BCG	生							①																
麻疹・風疹混合 (MR)	生																	② (注9)						
水痘	生											①			②							(注10)		
おたふくかぜ	生											①						② (注11)						
日本脳炎	不活化										生後6か月から接種可能				① ② ③		7.5歳まで				④ 9-12歳			
インフルエンザ	不活化										生後6か月から接種可能			毎年 (10、11月などに)	① ②							13歳以上①		
新型コロナウイルス	mRNA																							
ヒトパピローマウイルス (HPV)	9価	不活化																			(注12)	小6	中1①② (注13)	中2～高1相当 (注14)
	2価・4価	不活化																			(注12)	小6	中1①②③ (注13)	中2～高1相当 (注14)
ワクチン	種類	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	

  定期接種の推奨期間
   定期接種の接種可能な期間
   任意接種の推奨期間
   任意接種の接種可能な期間
   添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
   健康保険での接種時期