【医療関係者用】小児科学会が推奨する予防接種スケジュール

2024年10月27日版　日本小児科学会

ワクチン		種類	乳児期										幼児期							学童期／思春期				
			生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
B型肝炎	ユニバーサル	不活化			①	②				③			（注1）											
	母子感染予防		①	②					③															
ロタウイルス	1価	生			①	②	（注2）																	
	5価				①	②	③	（注3）																
肺炎球菌（PCV15、PCV20）		不活化			①	②	③						④						（注4）					
５種混合（DPT-IPV-Hib）		不活化			①	②	③						④			7.5歳まで				15歳未満まで使用可能				
３種混合（DPT）		不活化																	①（注5）				② 11-12歳（注6）		
２種混合（DT）		不活化																					① 11歳	12歳
ポリオ（IPV）		不活化																	①（注7）					
インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ） ※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化			①	②	③							④					（注8）					
４種混合（DPT-IPV） ※4種混合ワクチンで初回接種する場合		不活化			①	②	③							④		7.5歳まで				15歳未満まで使用可能				
BCG		生						①																
麻疹・風疹混合（MR）		生											①						②（注9）					
水痘		生											①		②				（注10）					
おたふくかぜ		生											①						②（注11）					
日本脳炎		不活化							生後6か月から接種可能								①②	③	7.5歳まで		④ 9-12歳			
不活化インフルエンザ		不活化							生後6か月から接種可能					毎年（10、11月などに）①②									13歳以上①	
経鼻弱毒生インフルエンザ		生														２歳以上～19歳未満に　毎年（10月、11月などに）①　点鼻								
新型コロナ		mRNA							製剤により使用できる年齢が異なる															
		不活化																						
ヒトパピローマウイルス（HPV）	9価	不活化																			（注12）	小6	中1①②（注13）	中2～高1相当	（注14）
	2価・4価	不活化																			（注12）	小6	中1①②③（注13）	中2～高1相当	（注14）
ワクチン		種類	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上

定期接種の推奨期間　定期接種の接種可能な期間　任意接種の推奨期間　任意接種の接種可能な期間　添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間　健康保険での接種時期